

## **AHORA LA IC CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN DE RANGO INTERMEDIO SE LLAMA.... LIGERAMENTE REDUCIDA**

*Autor: Marcos García Aguado*

*Fecha de publicación: 22/09/2021*

*Patología: Insuficiencia cardíaca / Categoría: Novedades*


*Tiempo de lectura: 1 minuto*

<https://www.carprimaria.com/leer-insuficiencia/insuficienciacardiaca-fraccioneyeccion-tratamiento>



En las nuevas guías de insuficiencia cardíaca (IC) de la Sociedad Europea de Cardiología, publicadas recientemente, se ha realizado un cambio en la clasificación de la IC según la fracción de eyección (FE) del ventrículo izquierdo (VI).

Actualmente la IC con FEVI  $\geq 40\%$  pero  $< 50\%$  deja de llamarse de “rango intermedio” y pasa a denominarse “ligeramente reducida”. Esta denominación resulta más adecuada, puesto que podría tratarse de una fase previa a la reducida y, además, la evidencia científica parece avalar la eficacia de los mismos fármacos que constituyen el tratamiento base de la ICFE reducida, es decir: sacubitrilo/valsartan (o IECA/ARAII) + inhibidores SGLT2 (dapagliflozina y empagliflozina) + betabloqueantes + bloqueantes de la aldosterona (espironolactona o eplerenona).



*Ilustración 1. Nueva terminología para la IC con FEVi  $\geq 40\%$  y  $< 50\%$ .*

## REFERENCIAS

*European Heart Journal*, Volume 42, Issue 36, 21 September 2021, Pages 3599–3726  
<https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/36/3599/6358045>